

Vanessa Chapuis Costa Pertence  
Gisele Cristina Carvalho Bezerra

O tratamento ortodôntico visa a obtenção de uma oclusão funcional e estética devolvendo uma harmonia oclusal e um periodonto saudável. Contudo, frequentes relatos do surgimento de recessões gengivais, durante e após ortodontia, têm sugerido envolvimento do mesmo na etiologia destas recessões. Paciente gênero masculino, 35 anos, compareceu a clínica da UNIVERSO com a queixa principal: “muito tempo que não vou ao dentista, preciso de limpeza”. Durante anamnese paciente relatou uso de aparelho ortodôntico por muito tempo, extração dos segundos pré molares superior e inferior por razões ortodônticas. Ao exame clínico, apresentava recessão generalizada com restaurações cervicais classe V, dificuldade de lateralidade para o lado direito sugerindo um contato prematuro, relato de dor ao comer coisas doces. Solicitado radiografia panorâmica e periapical, feito profilaxia na primeira consulta sem relato de sensibilidade e paciente apresenta boa higiene oral, orientou quanto instruções de higiene e escova macia. Planejamento proposto confecção de JIG, moldagem e montagem no articulador semi ajustável para estudo. Podemos concluir que primeiramente devemos estabelecer a etiologia dessa recessão gengival que pode ter sido sequela do tratamento ortodôntico que durou por muitos anos, escovação traumática ou trauma de oclusão, estabelecendo o diagnóstico podemos estabelecer a melhor conduta terapêutica, se será ajuste por desgaste seletivo ou restaurações classe V não cariosas.