

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA  
CURSO DE GRADUAÇÃO  
CURSO DE ODONTOLOGIA

Paloma Lopes de Souza  
(palomalopessouza2016@gmail.com)  
Thauanne Cristian Silva  
(thauannecristiansilvasilva@gmail.com)

## **CASO CLÍNICO**

Belo Horizonte  
2023

## SUMÁRIO

JUSTIFICATIVA.....	2
LITERATURA.....	2
METODOLOGIA .....	3
CONCLUSÃO .....	3
REFERÊNCIAS .....	5

## **JUSTIFICATIVA**

Nosso trabalho visa apresentar um caso clínico atendido na clínica escola da Faculdade Universo, onde uma paciente procurou atendimento devido estar precisando de tratamento odontológico apresentando algumas ausências dentárias desejando colocar uma prótese parcial removível.

## **LITERATURA**

A cárie e a doença periodontal são as condições clínicas, que se constituem como os principais motivos da perda dentária em adultos. Esse fato ocorre devido ao tratamento dessas doenças ser realizado tardiamente, em estágios avançados, quando o tratamento conservador não é mais possível. A dor é o motivo, que leva o adulto a procurar o dentista na maioria das vezes buscando de solução imediata para esse sintoma, baseada na condição da estrutura dentária, acaba tendo como desfecho a exodontia. (HAIKAL, DS. et. al, 2014)

A palavra anamnese traz em seu significado trazer da memória fatos relacionado ao paciente e possíveis manifestações de doenças que o mesmo apresente, buscando assim a maior fidelidade possível nas informações reportadas pelo paciente. Para isso o profissional deve entender esse momento como um dos pilares da confiança entre paciente-profissional para que através da criação de vínculo o paciente tenha segurança na adesão do tratamento, além de se sentir à vontade ao responder as perguntas sobre sua saúde e bem estar (BRANDÃO et al. 2018).

A perda dentária e a utilização inadequada de próteses removíveis têm impacto negativo na qualidade de vida da população a nível social e psicológico. Tais informações são importantes no âmbito de capacitar o cirurgião-dentista para lidar melhor com seus pacientes. A falta de dentes pode induzir a sucção da mucosa jugal para o espaço edêntulo, que a longo prazo, pode provocar uma lesão traumática no local. É muito importante saber a causa de possíveis alterações durante o exame intraoral, que podem induzir ao incorreto diagnóstico, uma vez que é comum se ver lesões traumáticas devido ao hábito de sucção. (SANTOS, 1999).

## **METODOLOGIA**

Paciente K.A.F.G, sexo feminino, 44 anos, frequentou a clínica escola da Faculdade Universo. Sua queixa principal era: - “Eu queria colocar um roach porque eu perdi os dentes”. Na anamnese a paciente relatou ser alérgica a penicilina e ser fumante há 10 anos. Nega uso de álcool e medicamento de forma contínua.

Os sinais vitais se encontram dentro da normalidade, o exame extraoral não apresentou nenhuma alteração e no intraoral foi visualizado no lábio inferior uma lesão traumática, onde a paciente relatou ter caído e batido a boca na borda da piscina e na mucosa jugal do lado esquerdo foi visualizado uma lesão traumática por mordida/má formação vascular, com tamanho aproximado de 2cm, arroxeadas, limites bem definidos, superfície regular, base séssil, circunscrita. Paciente relata ter o hábito de sucção da mucosa jugal devido a perda dentária. No odontograma foi verificado:

- Dentes 14, 15, 16, 24, 26, 35, 36, 46: ausentes
- Dentes 34 e 45: lesão de abfração
- Manchamento por nicotina generalizado
- Sisos erupcionados: esmalte fosco e sulco enegrecido

Na 1ª consulta foi realizado exame clínico (anamnese e exame físico), a paciente relatou que havia realizado a profilaxia há 1 mês na UBS. Foi encaminhada para realizar a avaliação para confecção da prótese parcial removível. Acompanhamento da lesão por trauma no lábio inferior e lesão traumática por mordida na mucosa jugal do lado esquerdo (aguardar confecção da prótese pois lesão coincide com espaço edêntulo onde houve relato por trauma de mordida). Caso a lesão não regrida, sugerimos a realização de biópsia.

## **CONCLUSÃO**

Dessa forma podemos concluir que é de extrema importância conscientizar o paciente sobre uma boa higiene oral, uma vez que a cárie é o principal fator para levar o paciente a ter perda dentária, provocando impacto negativo na qualidade de vida do paciente a nível social e psicológico.

A etapa da anamnese deve ser feita de modo criterioso e não devemos subestimá-la, uma vez que visualizaremos possíveis alterações da cavidade oral e que se feita da forma incorreta pode nos levar a diagnósticos incorretos.

## REFERÊNCIAS

BRANDÃO, B. A.; CORTEZ, D. L.; LOUREIRO, A. S.; MORAES, G. R.; BRÊDA, M. A.; FERNANDES, D. C. Importância de um exame clínico adequado para o atendimento odontológico. Cadernos de Graduação - Ciências Biológicas e de Saúde Unit. 2018. v. 5, n. 1, p. 77-88. Acesso em 03 maio 2022. Disponível em <<https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/5681/3083>>. Acesso em 24 de maio de 2023.

HAIKAL, D. S. et al. O acesso à informação sobre higiene bucal e as perdas dentárias por cárie entre adultos. Ciênc. saúde coletiva, 2014; 19(1): 287-300. Acesso em 24 de maio de 2023.

SANTOS, J. B. Ouvir o paciente: A anamnese no diagnóstico clínico. Brasília Médica. 1999; 36(3):90-95. Acesso em 24 de maio de 2023.