

Robson Lopes
Thales Rodrigo

Dentição Mista e Permanente

Nosso trabalho aborda a fases da dentição mista e dentição e permanente:

São duas fases cruciais no desenvolvimento da dentição humana, cada uma representando momentos distintos na vida em que a composição e a função dos dentes passam por mudanças significativas. A dentição mista, que ocorre na infância, marca a transição dos dentes de leite para os dentes permanentes, enquanto a dentição permanente caracteriza a fase adulta, em que a maioria dos dentes é permanente e deve ser mantida ao longo da vida.

Durante a dentição mista, uma combinação de dentes de leite e permanentes coexiste na boca, iniciando por volta dos 6 anos de idade e estendendo-se até aproximadamente os 12 anos. À medida que os dentes permanentes começam a erupcionar, eles gradualmente substituem os dentes de leite, um processo que continua até que todos os dentes de leite tenham sido substituídos. A dentição mista é uma fase crucial no desenvolvimento oral, e cuidar bem dos dentes permanentes emergentes é essencial para garantir uma saúde bucal adequada ao longo da vida.

A dentição mista pode ser dividida em três períodos distintos, cada um com características específicas: a fase inicial da dentição mista, a fase intermediária da dentição mista e a fase final da dentição mista. Cada período apresenta a erupção de diferentes grupos de dentes permanentes, criando uma mistura de dentes de leite e permanentes na arcada dentária. O monitoramento por um dentista é fundamental durante essas fases para garantir uma transição saudável para a dentição permanente.

A erupção e irrupção dentária são processos relacionados ao desenvolvimento dos dentes, mas ocorrem em estágios diferentes. A erupção refere-se ao processo pelo qual um dente emerge da gengiva e se torna visível na boca, enquanto a irrupção é o movimento ativo de um dente permanente para ocupar o espaço de um dente de leite que está prestes a ser substituído.

O apinhamento dentário é uma condição em que os dentes estão posicionados muito próximos uns dos outros na arcada dentária, resultando em falta de espaço adequado para acomodar todos os dentes de forma correta e alinhada. Isso pode afetar tanto a dentição mista quanto a permanente e pode se apresentar de diferentes formas em cada período. O tratamento do apinhamento geralmente envolve o uso de aparelhos ortodônticos para alinhar os dentes adequadamente.

A fase do "patinho feio" na odontologia se refere ao estágio durante o tratamento ortodôntico em que os dentes, devido ao apinhamento ou desalinhamento inicial, podem parecer esteticamente insatisfatórios antes de atingirem a posição ideal. Essa fase é normal e temporária, faz parte

do processo de correção ortodôntica e geralmente leva a resultados estéticos e funcionais satisfatórios no final do tratamento.

O Leeway Space é um espaço adicional na arcada dentária que ocorre durante a transição da dentição decídua para a permanente, permitindo ao ortodontista espaço adicional para corrigir problemas de apinhamento em outras áreas da boca. Isso é clinicamente importante porque pode evitar extrações desnecessárias de dentes permanentes e facilitar o alinhamento dental adequado.

Em relação à dentição permanente, ela é caracterizada por um conjunto de 32 dentes, incluindo incisivos, caninos, pré-molares e molares, que desempenham funções específicas na mastigação e na estética do sorriso. Os dentes permanentes são posicionados para criar uma oclusão funcional, e sua manutenção adequada é fundamental para a saúde bucal a longo prazo. Variáveis como o número de dentes ou a forma da dentição podem variar entre indivíduos, e é essencial consultar um dentista regularmente para cuidados odontológicos ao longo da vida.