

FICHA PARA SUBMISSÃO DE RESUMO

XVIII Jornada Odontológica da UNITRI

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria: (X) GRADUAÇÃO () PÓS-GRADUAÇÃO/PROFISSIONAIS |
| Tipo: (X) Caso Clínico () Trabalho Experimental / Pesquisa () Revisão de Literatura |
| Área do trabalho (subcategoria): Cirurgia e Implantodontia |

PROTÓCOLO DE IMPLANTE DE CARGA IMEDIATA INFERIOR ASSOCIADO À REMOÇÃO DE LESÃO ODONTOGÊNICA: RELATO DE CASO

Autores: Larissa Silva Kennedy ROLDÃO, Helen Keler Silva AMORIM, Pedro Gomes Junqueira MENDES, João Victor Loreno Ferreira COSTA, Caio Rodrigo de Oliveira MORÁBITO.

Resumo:

A instalação de implantes imediatos para reabilitação imediata de casos totais de mandíbula são procedimentos com alta previsibilidade e alta taxa de sucesso. Essa cirurgia comumente envolve a extração de elementos dentários condenados, e por vezes os mesmos podem apresentar algum tipo de lesão patológica de origem odontogênica, tais lesões devem ser removidas com finalidade de evitar evolução da lesão e um agravante a longo prazo para o paciente. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de reabilitação de protocolo imediato inferior associado a remoção de lesão odontogênica. Paciente do sexo feminino, JDF, 56 anos, compareceu ao departamento de implantodontia do INPES para realizar a reabilitação. Após a realização do exame radiográfico, observou-se a presença de uma lesão periapical associada ao elemento 38, sobrepondo a região do canal mandibular, por onde passa o nervo alveolar inferior. A lesão apresentava aspecto radiolúcido e circunscrito, sugestivo de cisto ou granuloma periapical. Foi feita a exodontia do elemento dentário associado à lesão e curetagem do alvéolo. Durante o processo de curetagem, foi necessário que parte da lesão não fosse removida, a fim de evitar a parestesia do nervo alveolar inferior. Para a realização do protocolo inferior, após a anestesia e confecção do retalho, foi feito o procedimento de osteotomia, com o objetivo de nivelar a altura óssea mandibular. Posteriormente, realizou-se a instalação dos implantes e com menos de 24h a entrega da prótese imediata provisória. Foi possível reestabelecer melhora na qualidade de vida da paciente e remover a lesão, que será acompanhada prospectivamente para observar sua regressão.

Palavras-chave: REABILITAÇÃO BUCAL. DOENÇAS PERIAPICAIS. CARGA

IMEDIATA EM IMPLANTE DENTÁRIO.