

FICHA PARA SUBMISSÃO DE RESUMO
XVIII Jornada Odontológica da UNITRI

Categoria: (<input checked="" type="checkbox"/>) GRADUAÇÃO () PÓS-GRADUAÇÃO/PROFISSIONAIS
Tipo: ()Caso Clínico ()Trabalho Experimental / Pesquisa (<input checked="" type="checkbox"/>) Revisão de Literatura
Área do trabalho (subcategoria): ORTODONTIA

**USO DA ORTODONTIA EM ELEMENTOS DENTÁRIOS COM HISTÓRICO DE
TRAUMA: REVISÃO DE LITERATURA**

Autores: Maria Clara Lizias CUNHA, Melissa Cassoli Cortelleti SILVA, Juliana CARMELO.

Resumo: O traumatismo dentário ocorre mais frequentemente em crianças por volta de 2 anos de idade, sexo masculino, acometendo comumente os elementos anteriores da arcada dental superior. Sendo assim, o paciente pode sofrer luxação, avulsão do dente, fratura em esmalte, acometendo ou não a polpa dentária. Além disso, a perda do elemento, na maioria das vezes de forma precoce, pode causar uma série de complicações aos dentes envolvidos no acidente, assim como seus sucessores permanentes (tendo em vista que a idade mais prevalente de traumas é na dentadura decídua). A ortodontia auxilia no tratamento dos traumas com o uso de mantenedores de espaço, nos casos de perda precoce e de contenções, nos casos de luxação. Os dados foram apurados a partir de uma revisão de literatura em artigos que se aprofundam no tema, sendo utilizado as bases de dados: Google acadêmico, LILACS e SciELO, nas línguas portuguesa e inglesa, com data de publicação entre 2018 e 2023. Assim deduz-se que a ortodontia, quando indicada, tem valia para o tratamento de dentes traumatizados, tanto na proervação dos dentes decíduos e permanentes com uso de contenções adequadas, quanto no uso de mantenedores de espaço para adequação nos casos de dentes que foram avulsionados.

Palavras-chave: TRAUMATISMO DENTÁRIO. ORTODÔNTICO. TRATAMENTO.

